Prise en charge aux urgences des anomalies d'imagerie liées à l'amyloïde (ARIA)

Au service des urgences, on doit considérer les ARIA comme faisant partie du diagnostic différentiel chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer (MA) traités par anticorps monoclonaux (AcM) anti-amyloïde

En quoi consistent les ARIA?

- Les ARIA résultent de l'accumulation d'amyloïde bêta (Aβ) dans les vaisseaux sanguins cérébraux
- La mobilisation de l'Aβ par les AcM augmenterait la perméabilité des vaisseaux sanguins aux liquides ou aux produits sanguins, ce qui mènerait à l'apparition d'ARIA

IL EXISTE DEUX SOUS-TYPES D'ARIA

ARIA-œdème/épanchement (ARIA-E) :

- Accumulation de liquide dans le cerveau due à des lésions à la barrière hémato-encéphalique¹
- Œdème cérébral vu comme des hyperintensités sur séquences FLAIR²

ARIA-hémorragie/hémorragie (ARIA-H) :

- Dépôt d'hémossidérine dans le parenchyme (microhémorragies) ou l'espace leptoméningé/sous-pial (sidérose superficielle)^{1,2}
- Saignements vus comme des hypointensités sur séquences en écho de gradient T2* ou SWI^{2,3}

Dans de rares cas, des hémorragies intracérébrales lobaires (macrohémorragies) peuvent également se produire⁴

Figures créées à l'aide de Biorender.com. Images d'IRM : données internes.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES CLINIQUES COURANTS DES ARIA?

Les patients atteints d'ARIA symptomatiques peuvent présenter différents symptômes, notamment¹:

Les ARIA peuvent être graves et mettre la vie en danger

Environ 80 % des cas d'ARIA sont asymptomatiques; le plus souvent, elles sont détectées par une surveillance régulière par IRM^{1,5,6}

DIAGNOSTIC DES ARIA AUX URGENCES²

Antécédents médicaux :

- ✓ Diagnostic de MA
- ✓ Traitement récent ou actuel par anti-amyloïde
- ☐ Vérifiez le bracelet d'alerte-médicaments ou la carte de médicaments

ENVISAGEZ UN DIAGNOSTIC D'ARIA!

UTILISATION DE L'IRM POUR DÉTECTER LES ARIA⁶

- L'IRM est essentielle pour le diagnostic et le diagnostic différentiel des ARIA⁷
- L'utilisation de la tomodensitométrie est limitée par son manque de sensibilité aux ARIA-H et aux formes plus légères d'ARIA-E⁷
- Il est essentiel de demander les séquences IRM appropriées pour détecter les ARIA⁷
- Si possible, demandez une IRM dont les caractéristiques sont similaires à celles de
- l'acquisition de référence pour faciliter les comparaisons⁸
- Il est important de tenir compte de l'intensité du champ, car cela peut nuire à la visibilité des microhémorragies⁹

INTENSITÉ DU CHAMP⁶

- Appareil 3 T : recommandé
- Appareil ≥ 1,5 T : adéquat
- Appareil < 1,5 T : inadéquat

Le protocole consensuel standardisé d'IRM pour la détection des ARIA peut être réalisé en < 15 minutes⁶

- L'AVC ischémique peut imiter les ARIA E œdème² DWI séquences can support differential diagnosis²
- Les séquences IPD peuvent aider au diagnostic différentiel²

*Figure adaptée avec l'autorisation de Cogswell (2022)⁴; †Cas présenté avec l'autorisation de Balachandran G, Radiopaedia.org, RID-10704⁸; Cas présenté avec l'autorisation d'Abdrabou A, Radiopaedia.org, RID-22738.⁹

AUX FINS DIAGNOSTIQUES, IL EST ESSENTIEL DE SAVOIR SI UN PATIENT EST TRAITÉ PAR AcM ANTI-AMYLOÏDE²

Il est crucial de recueillir les informations appropriées pour établir un diagnostic exact. Chez les patients atteints d'ARIA, un diagnostic différentiel erroné d'AVC peut mener à l'administration d'un agent thrombolytique et accroître ainsi le risque d'hémorragie intracérébrale¹⁰

CLASSIFICATION DE LA GRAVITÉ DES ARIA⁴

	LEGÈRE	MODÉRÉE	GRAVE
ARIA-E Nouvelle hyperintensité sulcale et/ou corticale/ sous-corticale sur séquence FLAIR	 1 emplacement, < 5 cm	 1 emplacement, 5 à 10 cm, OU > 1 emplacement, < 10 cm chacun	 ≥ 1 emplacement, > 10 cm
ARIA-H Nouvelle sidérose superficielle	 1 zone focale	 2 zones focales	 >> 2 zones focales ¹¹
ARIA-H Nombre de nouvelles microhémorragies	 ≤ 4 microhémorragies	 5 à 9 microhémorragies	 ≥ 10 microhémorragies

Les ARIA sont classées sur la base des effets apparus en cours de traitement. Pour les ARIA-H, ce nombre inclut les nouvelles microhémorragies cumulée ou les régions de sidérose par rapport à l'examen au départ, avant le début du traitement⁴.
Images d'IRM 1 à 5 et 7 à 9 : données internes.
Image d'IRM 6 adaptée avec l'autorisation de Kate et al. (2018)¹¹ CC BY 4.0 : <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

FACTEURS DE RISQUE D'ARIA¹

GESTION D'ARIA AUX URGENCES

Au Canada et aux États-Unis, il n'existe actuellement aucune ligne directrice fondée sur des données probantes pour la prise en charge des ARIA aux urgences⁵

La prise en charge des ARIA et de l'AVC est urgente : une action rapide et un traitement approprié sont essentiels pour assurer des résultats optimaux pour les patients⁵

Si l'on soupçonne la présence d'ARIA, il est crucial de communiquer ceci au neurologue, ou au médecin du patient⁶

Consultez les renseignements thérapeutiques des AcM anti amyloïde pour plus de détails. Il faut effectuer une évaluation clinique minutieuse avant de poursuivre le traitement par AcM anti-amyloïde¹²

Balayez le code QR pour consulter les protocoles d'IRM pour les ARIA et d'autres ressources de l'American Society of Neuroradiology

Balayez le code QR pour obtenir de plus amples renseignements sur les ARIA à partir de www.UnderstandingARIA.ca

RÉFÉRENCES

- Hampel H, et al. Neurodegener Dis Manag. 2024;14(3):51-62.
- Barakos J, et al. AJNR Am J Neuroradiol. 2013;34(10):1958-1965.
- Hampel H, et al. Brain. 2023;146(11):4414-4424.
- Cogswell PM, et al. AJNR Am J Neuroradiol. 2022;43(9):E19-E35.
- Lo AX, et al. J Am Geriatr Soc. 2024;72(12):3945-3949.
- Cogswell PM, et al. AJNR Am J Neuroradiol. 2025;46(1):24-32.
- Barakos J, et al. J Prev Alzheimers Dis. 2022;9(2):211-220.
- Balachandran G. Radiopaedia.org. <https://doi.org/10.53347/RID-10704> (consulté en janvier 2025).
- Abdrabou A. Radiopaedia.org. <https://doi.org/10.53347/RID-22738> (consulté en janvier 2025).
- Reish NJ, et al. N Engl J Med. 2023;388(5):478-479.
- Kate MT, et al. Alzheimers Res Ther. 2018;10(1):112.
- Ramanan VK, pour GS. Mol Neurodegener. 2023;18(1):42.
- Duchesne S, et al. Can J Neurol Sci. <https://doi.org/10.1017/cjn.2024.338> (consultation en cours)

ABBREVIATIONS

- AAC, angiopathie amyloïde cérébrale; Aβ, amyloïde bêta; AcM, anticorps monoclonal; ARIA, anomalies d'imagerie liées à l'amyloïde; ARIA-E, anomalies d'imagerie liées à l'amyloïde-œdème/épanchement; ARIA-H, d'imagerie liées à l'amyloïde-hémossidérine/hémorragie; HSA, hémorragie sous-arachnoïdienne; IPD, imagerie pondérée en diffusion; FLAIR, inversion-récupération supprimant le signal des liquides; IRM, imagerie par résonance magnétique; ISM, imagerie de susceptibilité magnétique; MA, maladie d'Alzheimer; SEPR, syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible; t, Tesla; TDM, tomodensitométrie.